PROPOSTA PARA RASTREIO DE CHLAMYDIA/NEISSERIA EM CLÍNICA PRIVADA

Caroline Graça Mota Damasceno¹, Bruna Obeica Vasconcellos¹, Jacqueline Guimarães de Souza Haimuri², Marcela Ignacchiti Lacerda³, Ana Ximena Zunino⁴, Cláudia Márcia de Azevedo Jacyntho⁵

1: EMSM, Rio de Janeiro/RJ; 2: HMRC, Rio de Janeiro/ RJ; 3: HUPE – Uerj, Rio de Janeiro/RJ;
4: HUAP– Uff, Niterói/RJ; 5: HFSE, Rio de Janeiro/RJ

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis incluem um grupo de doenças de interesse tanto na saúde pública quanto privada dada sua alta prevalência. Dentre elas, a clamídia e gonorreia, na maioria dos casos, não provocam sintomas, mas, podem ter repercussões consideráveis em ambos os sexos, especialmente na fertilidade, e uma forma de rastreio deve ser discutida, de acordo com a população alvo.

Objetivos: Propor rotina de rastreio para clamídia e gonorreia em clínicas privadas como população alvo.

Materiais e métodos: Revisão de artigos buscados nas bases de dados PubMed, Scielo e Jama com os descritores “screening for chlamydia”, “screening for neisseria gonorrhoea”, “screening for STIs” do ano 2016 a 2022.

Resultados: Uma forma de rastreio é através de testes de amplificação de ácido nucléico (NAAT) para *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*, que possuem alta sensibilidade e especificidade, além de poderem ser realizados com diversos tipos de amostra. Seu rastreio então deveria ser realizado em todas as mulheres sexualmente ativas abaixo dos 30 anos, em gestantes no primeiro e terceiro trimestre, em mulheres que vivem com HIV ou tenham outra IST ou parceiro com IST no último ano, em mulheres sem relacionamento estável, antes de inserção de DIU, realização de excisão de zona de transformação/conização, histeroscopia, histerossalpingografia, pós-exposição ao HIV, o rastreio para outras ISTs igualmente prevalentes, e atendimento à vítima de violência sexual. Já o intervalo entre testes não foi determinado ainda com bases científicas consistentes e deve ser de acordo com novas exposições de risco da paciente. Nós sugerimos, como a maioria dos protocolos, que seja realizado de forma anual nas clínicas privadas, até semestral em grupos com altíssimo risco e repetindo três meses após o tratamento. A coleta é realizada por meio de um *swab* que deve ser conservado em meio próprio e enviado para a análise.

Conclusão: O rastreio, por mais que represente um custo, deve ser realizado por ser não invasivo e permitir o tratamento precoce e tratamento de infecções que possuem alta morbidade para as pacientes.